

Análisis de la asociación espacial

Correlación entre variables espaciales

Gerardo Martín


2022-06-29

Además de valores de variables, tenemos ubicación, p. ej.

Table 1: Primeras seis filas de una conjunto de variables raster tabuladas. Las coordenadas corresponden al centro de cada píxel.


x	y	Var-1	Var-2	Var-3
-104.8380	29.93903	186	92	173
-104.6714	29.93903	190	96	178
-104.5047	29.93903	188	95	179
-104.3380	29.93903	166	79	165
-104.1714	29.93903	171	83	170
-104.0047	29.93903	176	87	174

Las variables espaciales




Las variables espaciales


Var-1



Var-2



Var-3



Comparando las paletas de color, no nos es del todo posible detectar correlaciones.

Necesitamos:

1. Gráfico de dispersión
2. Coeficiente de correlación

Paquete **raster** contiene métodos para hacer el cálculo entre pares de capas

Función **pairs** hace todo en automático, uso

```
pairs(raster)
```

- Único argumento necesario, nombre de objeto tipo **raster**, **stack** ó **brick**
- En ejemplo anterior, el nombre del objeto es **raster**, necesitamos otro nombre


```
# para una sola capa
```

```
r <- rast("../Datos-ejemplos/Var-1.tif")
```

```
#Para varias capas alineadas
```

```
r <- rast(list.files("../Datos-ejemplos/",  
                    "tif", full.names = T))
```

`pairs(r)`



- Diagonal principal → Histograma de variable individual
- Triángulo inferior → Gráfico de dispersión
- Triángulo superior → Coeficiente de correlación estimado (ver cálculo aquí)

Correlación entre puntos y raster

- Cuando tenemos mediciones colectadas, podríamos tener sólo coordenadas de los puntos de muestreo

Table 2: Primeras seis filas de una base de datos de mediciones colectadas en campo.

	x	y	mediciones
73	-102.7928	29.57881	49.62024
459	-103.6011	27.38053	41.14992
813	-104.5670	25.53772	137.04156
49	-101.8276	29.87109	51.70786
476	-100.5730	27.40428	103.70981
144	-101.0474	29.20245	75.43274

Necesitamos medir con qué proceso ambiental (representado con una capa raster) nuestros datos están asociados

- Tenemos 3 capas:
 - Var.1, Var.2, Var.3
- Para encontrar asociación, necesitamos:
 1. Graficar valores de variable colectada sobre capas raster
 2. Extraer valores en localidades de muestreo de capas raster
 3. Hacer prueba de correlación entre las 3 capas raster y mediciones

Gráfico de valores colectados 1




Gráfico de valores colectados 2

```
plot(r[[2]])  
points(puntos[, c("x", "y")], cex = puntos$mediciones/50)
```





Gráfico de valores colectados 3



Función `extract`, dos argumentos:

1. Capa(s) raster de dónde extraer valores
2. Conjunto de coordenadas para extraer valores


```
valores.capas <- extract(r, puntos[, c("x", "y")])  
puntos <- data.frame(puntos, valores.capas)
```

(El objeto `puntos` fue generado anteriormente, pueden ver detalles de simulación en código fuente)


Valores extraídos de capa raster


	x	y	mediciones	ID	Var.1	Var.2	Var.3
73	-102.7928	29.57881	49.62024	1	199	106	161
459	-103.6011	27.38053	41.14992	2	179	105	143
813	-104.5670	25.53772	137.04156	3	187	126	193
49	-101.8276	29.87109	51.70786	4	203	105	149
476	-100.5730	27.40428	103.70981	5	224	135	143
144	-101.0474	29.20245	75.43274	6	213	121	131
255	-102.5358	28.58792	35.05952	7	174	101	132
201	-101.4132	28.86275	69.94669	8	209	125	134
646	-102.3974	26.52351	92.91473	9	211	134	153
824	-102.6020	25.42059	131.78474	10	218	147	148

Gráficos de dispersión 1



Gráficos de dispersión 2





Coefficientes de correlación

```
cor(puntos[, c("mediciones", "Var.1", "Var.2", "Var.3")])  
  
##           mediciones      Var.1      Var.2      Var.3  
## mediciones 1.00000000 0.5845601 0.8107585 0.06998098  
## Var.1      0.58456009 1.0000000 0.7522413 -0.21898861  
## Var.2      0.81075853 0.7522413 1.0000000 -0.01619570  
## Var.3      0.06998098 -0.2189886 -0.0161957 1.00000000
```

En ausencia de mayor información

- Mediciones están asociadas espacialmente con **Var.2**